REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

DIREZIONE

PROTOCOLLO USCITA

Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria

URGENTE

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite

a tutte le articolazioni organizzative interne

- *delle Aziende Sanitarie Locali*
- *delle Aziende Ospedaliero Universitarie*
- *degli IRCCS pubblici*
- *degli IRCCS/EE privati*

Ai Direttori dei Laboratori
della rete regionale Laboratori SARS-CoV-2

e, per conoscenza

Ai Componenti Cabina di Regia regionale Covid*Vacc*
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Salute
Al Dirigente della Sezione Istruzione e Università
Al Direttore Generale InnovaPuglia
Al Direttore Generale Aress Puglia
Al Responsabile Scientifico OER Puglia
Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale
Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale
Alle Rappresentanze sindacali regionali dei MMG/PLS
Alle Oo.Ss. del personale medico, dirigenza e comparto SSR
Agli Ordini professionali
Al Presidente ANCI Puglia
Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale della Puglia
Ai Rettori delle Università e Politecnici universitari di Puglia
Ai Comandi regionali delle Forze Armate
A S.E. Prefetto di Bari quale coordinamento regionale Prefetture e Forze dell'Ordine
All' Assessore alla Sanita e Benessere animale
Al Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: **Emergenza Covid-19 – Misure di prevenzione e controllo infezioni SARS-CoV-2 – Varianti – Vaccinazione anti Covid-19 - Indicazioni ad *interim* – Circolare Ministero Salute prot. 0010154 del 15.03.2021 – Notifica.**

Si comunica che con circolare prot. 0010154 del 15.03.2021 il Ministero della Salute ha trasmesso il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 recante «Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19» del 13 marzo.

L'Istituto Superiore di Sanità ha ritenuto di formulare tali indicazioni ad *interim* in ragione della circolazione prolungata di SARS-Cov-2 e del meccanismo naturale di accumulo di errori durante la replicazione virale che generano la comparsa di varianti virali di cui solo alcune destano preoccupazione