



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE

DIREZIONE

URGENTE

Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite
a tutte le articolazioni interne

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliere Universitarie
- degli IRCCS pubblici
- degli IRCCS/EE privati

Al Coordinatore Rete Malattie Rare Puglia
Al Coordinatore Rete Oncologica Puglia
Al Coordinatore Rete Ematologica Puglia
Al Coordinatore Rete Nefrologica-Dialitica-Trapiantologica (ReNDiT) Puglia
Ai Referenti delle Reti Talassemia, Parkinson, T.A.O., Percorso nascita, Terapia del Dolore di Puglia

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:

- dei MMG/PLS
- delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
- delle Strutture private accreditate

Agli Ordini Professionali
e, per conoscenza

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento
Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale
Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale
Al Responsabile scientifico OER Puglia
Al Direttore Generale Aress Puglia
All' Assessore alla Sanità, Benessere animale e controlli in sanità

OGGETTO: **DGR 472/2021 - Piano Strategico Vaccinazione anti Covid-19 - Circolare Ministero Salute 50900/2022 – Aggiornamento indicazioni d'uso vaccino Nuvaxovid (Novavax) – NOTIFICA – INDICAZIONI OPERATIVE.**

Facendo seguito alle circolari di questo Dipartimento aventi prot. AOO/005/0001636 del 24.02.2022, si trasmette la circolare del Ministero della Salute prot. 0050900 del 21.12.2022 con la quale si aggiornano le indicazioni di utilizzo del vaccino a sub unità proteica *Nuvaxovid* nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

1. Indicazioni d'uso

Si specifica che il vaccino *Nuvaxovid* è indicato:

- come **ciclo primario** con due dosi (da 0,5 mL ciascuna) a distanza di 3 settimane (21 giorni) l'una dall'altra, **nei soggetti a partire dai 12 anni di età**;
- come completamento di un ciclo primario (al dosaggio di 0,5 mL) in soggetti a partire dai 12 anni di età, che hanno già ricevuto una dose di vaccino a m-RNA e per i quali il proseguimento con tale vaccino non sia ritenuto opportuno (alla distanza di almeno 21 giorni dopo una prima dose con Comirnaty o di almeno 28 giorni dopo una prima dose con Spikevax);
- come **dose di richiamo omologa** (dopo completamento del ciclo primario con *Nuvaxovid* stesso), al dosaggio di 0,5 mL, a distanza di almeno 6 mesi (180 giorni) dal completamento del ciclo primario, **nei soggetti a partire dai 18 anni di età**;